


KAKO FUNKCIONIRA ORALNA VAKCINACIJA LISICA?

Mamci-vakcine se izbacuju iz aviona na područja gdje žive lisice. Lisice mogu nanjuštiti manjce sa ve-
like udaljenosti. Kada lisica zagrije mamac ujedno
probije i tečni dio sa vakcinom koja se kroz usta
životinje proširi stvarajući antitijela protiv bolesti.
Zaštitom lisica od bjesnila, na ovaj način štittimo i
domaće životinje i ljude jer prestaju biti izloženi
riziku od zaraze.



ŠTA VI TREBATE URADITI?

Vodič tokom trajanja vakcinacije i 7 dana nakon vakcinacije:

Kao prvo možete pomoći u širenju informacija o oralnoj vakcinaciji tako što ćete razgovarati sa djecom i savjetovati ih da ne dotiču mamce-vakcine dok se igraju vani. Ukoliko imate psa, pokušajte ga držati u kući i svakako na uzici dok šetate, vodeći računa da ne pojede mamac -vakcinu. Domaće životinje, kao npr. mačke takođe treba pomno posmatrati tokom ovog perioda ukoliko je to moguće.

- Ne dirajte mamce-vakcine – one su za lisice!
- Ukoliko vaš kućni ljubimac ugrabi mamac – ne pokušavajte ga izvaditi iz usta – mamci ne mogu naškoditi psima i mačkama ali je moguće da će doći do povraćanja ukoliko pojedu nekoliko mamaca.
- Ukoliko pronađete mamac na otvorenom prostoru – ostavite ga tamo. Mamci imaju veoma jak miris koji je neprijatan za ljude i većinu drugih životinja.
- Ukoliko je mamac neoštećen i na otvorenom prostoru gdje kućni ljubimci ili djeca mogu da ga pronađu, gurnite ga pod žbun ili drvo ali samo ukoliko imate rukavice ili koristite plastičnu kesu.
- Ukoliko dodirnete mamac, a pri tome imate posjekotinu na rukama ili otvorenu ranu ili dotaknete oči nakon što ste dodirnuli tečnost vakcine iz probijene kapsule unutar mamca – obavezno otiđite do najbližeg doktora i posavjetujte se o daljem tretmanu.
- **Ne koristite oralnu vakcinu za vakcinaciju viših kućnih ljubimaca protiv bjesnila – pasa ili mačaka!** Iako ova vakcina nije opasna, doza u oralnoj vakcini-mamcu nije dovoljna da zaštiti vašeg kućnog ljubimca od bjesnila. Ne zaboravite da je vakcinacija kućnih ljubimaca protiv bjesnila vaša za-
konska obaveza jednom godišnje.

OČEKIVANI REZULTATI

Većinu mamaca-vakcina lisice će pojesti u roku od 4-5 dana i rizik od bjesnila će biti smanjen u čitavoj zemlji. Vakcinacija će se organizirati u nekoliko narednih godina kako bi se osiguralo da sva mladunčad i nezaštićene lisice iz jedne godine budu vakcinisani u svakoj narednoj godišnjoj kampanji.

Dodatne informacije

Molimo Vas kontaktirati nas putem e-pošte na adresi
info_bjesnilo@vet.gov.ba ili nazovite telefonski broj **066/004-337**

Više informacija na:
www.vet.gov.ba